

Halina Rudnicka

RÓŻYCZKA W 1993 ROKU*

Po epidemii różyczki w poprzednim roku nastąpił w roku 1993 spadek liczby zachorowań. Zarejestrowano 64043 zachorowania a zapadalność wyniosła 166,5 na 100 000 (tab. I). Najwyższą zapadalność zanotowano w województwie białostockim (629,8 na 100 000). Najniższą zapadalność (poniżej 20 na 100 000) miało województwo lubelskie i siedleckie. Hospitalizowano 165 osób.

Tabela I. Różyczka w Polsce w latach 1987-1993.

Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców wg województw.

Województwo	Mediana 1987-1991		1992		1993	
	zachorow.	zapadal.	zachorow.	zapadal.	zachorow.	zapadal.
1	2	3	4	5	6	7
POLSKA	19 120	50,8	398 704	1 039,2	64 043	166,5
1. St. warszawskie	1 487	61,3	48 027	1 983,5	879	36,5
2. Białkopodlaskie	148	48,7	5 251	1 714,0	108	35,0
3. Białostockie	287	41,7	4 978	715,0	4 399	629,8
4. Bielskie	397	43,9	9 083	998,9	2 523	277,4
5. Bydgoskie	336	30,4	6 195	554,2	3 507	311,8
6. Chełmskie	76	30,7	2 360	950,5	67	26,9
7. Ciechanowskie	232	54,2	5 863	1 361,1	409	94,1
8. Częstochowskie	310	40,0	3 953	508,6	1 258	160,9
9. Elbląskie	175	37,0	2 905	602,5	2 202	451,8
10. Gdańskie	358	28,0	7 114	493,3	3 174	220,3
11. Gorzowskie	230	46,3	6 861	1 360,7	1 149	226,6
12. Jeleniogórskie	378	73,5	6 357	1 224,9	244	46,7
13. Kaliskie	238	33,8	6 990	978,1	439	61,1
14. Katowickie	1 931	48,5	43 015	1 072,9	5 475	138,4
15. Kieleckie	448	40,2	10 665	946,0	2 460	216,6
16. Konińskie	118	25,5	1 861	394,5	896	188,2
17. Koszalińskie	262	51,7	2 563	500,3	1 129	219,0
18. M. krakowskie	651	53,2	14 164	1 146,3	1 660	134,6
19. Krośnieńskie	96	19,9	1 852	370,9	348	69,2
20. Legnickie	332	66,4	7 378	1 418,4	450	86,4

* przy współpracy technicznej p. Grażyny Dutkiewicz

c.d. tab. I

1	2	3	4	5	6	7
21. Leszczyńskie	290	76,0	4 189	1 072,9	544	138,3
22. Lubelskie	319	31,3	18 062	1 769,2	179	17,5
23. Łomżyńskie	77	22,5	4 241	1 216,1	187	53,0
24. M. łódzkie	563	49,5	10 129	892,9	836	74,1
25. Nowosądeckie	367	52,8	5 602	792,9	1 212	168,6
26. Olsztyńskie	359	48,4	5 055	665,6	3 961	518,3
27. Opolskie	1 090	106,7	5 892	576,2	971	94,6
28. Ostrołęckie	163	41,0	5 628	1 407,4	334	82,5
29. Piłskie	163	34,6	2 539	524,1	1 001	205,0
30. Piotrkowskie	378	58,9	6 341	984,8	592	91,8
31. Płockie	191	37,0	5 089	982,1	570	109,5
32. Poznańskie	1 006	76,7	22 209	1 655,4	2 244	167,0
33. Przemyskie	93	22,9	2 167	529,8	962	233,5
34. Radomskie	162	21,7	7 162	949,0	1 731	227,7
35. Rzeszowskie	363	51,8	6 881	940,8	334	45,3
36. Siedleckie	153	23,8	5 945	908,3	85	12,9
37. Sieradzkie	122	29,9	3 729	913,1	260	63,1
38. Skierniewickie	103	24,7	6 086	1 445,3	198	46,8
39. Słupskie	202	49,9	4 504	1 077,5	1 340	317,2
40. Suwalskie	444	96,5	4 664	980,7	1 328	276,1
41. Szczecińskie	658	67,8	7 494	766,5	4 017	408,5
42. Tarnobrzeskie	556	92,6	8 754	1 450,5	1 625	267,6
43. Tarnowskie	275	42,0	3 779	558,6	779	113,7
44. Toruńskie	180	27,3	2 572	388,9	3 229	484,8
45. Wałbrzyskie	371	50,0	6 188	835,5	627	84,5
46. Włocławskie	170	39,7	5 918	1 374,2	276	63,7
47. Wrocławskie	638	56,7	19 149	1 692,4	587	51,8
48. Zamojskie	189	38,6	4 710	959,8	131	26,5
49. Zielonogórskie	264	40,2	6 591	993,4	1 127	168,7

Sezonowy wzrost liczby zachorowań wystąpił w pierwszym półroczu, a największą liczbę zachorowań (10144) zanotowano w kwietniu.

Analiza zachorowań na różyczkę w Polsce wykazała nieco wyższą ogólną zapadalność mężczyzn (170,5 na 100 000) niż kobiet (162,7). Zapadalność kobiet była wyższa od zapadalności mężczyzn we wszystkich grupach wieku, z wyjątkiem grupy 15-19 lat (tab. II). Wytlumaczyć to można wpływem szczepień przeciw różyczce dotyczących tylko dziewcząt.

Podobnie jak w poprzednich latach najwyższa zapadalność dotyczyła dzieci w wieku 5-9 lat (910,5 na 100 000), a w tym dzieci siedmioletnich (1 183,0 na 100 000). Zachorowania dzieci w wieku do 14 lat stanowiły 93,6% ogółu zachorowań na różyczkę.

Ogólny współczynnik zapadalności na różyczkę w miastach (190,4) był wyższy niż na wsi (128,0) (tab. III).

Tabela II. Różyczka w Polsce w 1993 r.

Zapadalność na 100 000 ludności i podział procentowy wg płci i wieku.

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapadal.	%	zapadal.	%	zapadal.	%
0-4	427,6	18,3	438,7	17,7	433,0	18,0
0	190,5	1,5	188,4	1,4	189,5	1,5
1	468,4	3,9	449,3	3,6	459,1	3,7
2	418,9	3,6	416,6	3,4	417,8	3,5
3	453,6	4,0	515,7	4,3	483,8	4,1
4	581,9	5,3	596,9	5,1	589,2	5,2
5-9	858,3	43,9	965,2	46,9	910,5	45,4
5	615,3	5,8	675,8	6,0	644,7	5,9
6	834,9	8,1	919,0	8,5	875,9	8,3
7	1 132,1	11,6	1 236,1	12,1	1 183,0	11,8
8	839,8	9,0	988,2	10,1	912,4	9,6
9	849,8	9,4	975,7	10,3	911,4	9,8
10-14	569,6	30,4	589,2	29,9	579,1	30,2
15-19	118,2	5,9	36,0	1,7	78,0	3,8
20-24	16,8	0,7	29,5	1,2	23,0	0,9
25-29	7,6	0,3	22,7	0,9	15,0	0,6
30-34	5,0	0,2	19,6	0,9	12,2	0,6
35-39	2,6	0,1	9,3	0,5	5,9	0,3
40-44	1,8	0,1	3,8	0,2	2,8	0,1
45-49	1,4	0,0	1,8	0,1	1,6	0,1
50-54	0,3	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0
55-59	0,2	0,0	0,6	0,0	0,4	0,0
60 i >	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0
Ogółem	170,5	100,0	162,7	100,0	166,5	100,0

Tabela III. Różyczka w Polsce w 1993 r.

Zapadalność na 100 000 ludności i podział procentowy według płci i środowiska.

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	201,0	180,6	123,5	132,6	170,5	162,7
%	50,5	49,5	48,2	51,8	49,9	50,1
Zapadalność na 100 000	190,4		128,0		166,5	
%	70,6		29,4		100,0	

Tabela IV. Różyczka w Polsce w 1993 r.

Zapadalność na 100 000 ludności wg środowiska oraz liczby ludności w miastach.

Rok	Ogółem	Miasta				Wieś	
		Razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.		> 100 tys.
1992	1 039,2	1 254,4	1 166,7	1 137,8	1 225,6	1 337,3	687,0
1993	166,5	190,4	264,3	207,6	211,3	148,9	128,0

Najwyższa zapadalność na różyczkę dotyczyła miast o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. (264,3), najniższa zaś – miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. (148,9) (tab. IV). W 1993 roku zaszczepiono przeciw różyczce 117 937 dziewcząt w 13 roku życia (rocznik 1981). Dziewczęta urodzone w 1980 r. są zaszczepione w 90,8%, a urodzone w 1979 r. w 94,9%.