

Halina Rudnicka, Lidia Brydak

## GRYPA W 1994 ROKU\*

W 1994 r. zarejestrowano w Polsce 471 524 zachorowania na grypę a więc ponad 5-krotnie mniej niż w roku 1993. Najwyższą zapadalność zanotowano w województwie łódzkim (14 611,8 na 100 000); wysoką w województwach: warszawskim (5190,7), szczecińskim (4184,5) oraz wrocławskim (4000,9). Najniższą zapadalność (poniżej 10,0 na 100 000) zarejestrowano w woj.: krakowskim, radomskim, rzeszowskim i sieradzkim. W woj. łomżyńskim w 1994 r. nie zanotowano zachorowań na grypę.

Zapadalność na grypę w skali całej Polski wyniosła 1223,4 na 100 000 (tab. I). Zachorowania dzieci w wieku do 14 lat stanowiły 44% ogółu zachorowań na grypę (207 412 przypadków) a zapadalność wynosiła 2481,4 na 100 000.

Hospitalizowano 85 osób (0,02% ogółu przypadków) w tym 49 dzieci w wieku do 14 lat.

Tabela I. Grypa w Polsce w latach 1993-1994 wg województw. Zachorowania, zapadalność na 100 000 i liczba zgonów, umieralność na 100 000.

Województwo	1993				1994			
	Liczba zachorowań	Zapad. na 100 000	Liczba zgonów	Umieralność na 100 000	Liczba zachorowań	Zapad. na 100 000	Liczba zgonów	Umieralność na 100 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Polska	2717585	7066,2	88	0,23	471524	1223,4	30	0,08
1. St. warszawskie	334896	13892,2	10	0,42	125289	5190,7	1	0,04
2. Białkopodlaskie	4721	1529,5	-	-	79	25,6	-	-
3. Białostockie	177	25,3	-	-	79	11,3	-	-
4. Bielskie	120187	13215,2	3	0,33	2235	244,8	-	-
5. Bydgoskie	81528	7248,5	-	-	9225	818,0	1	0,09
6. Chełmskie	11012	4415,2	1	0,40	43	17,2	-	-
7. Ciechanowskie	1348	310,2	-	-	85	19,5	-	-
8. Częstochowskie	27716	3545,9	-	-	366	46,8	-	-
9. Elbląskie	2373	486,9	-	-	110	22,5	-	-
10. Gdańskie	113163	7853,8	-	-	288	19,9	-	-
11. Gorzowskie	44101	8698,7	-	-	9765	1920,0	-	-
12. Jeleniogórskie	63799	12216,7	1	0,19	6252	1194,7	2	0,38
13. Kaliskie	48721	6779,2	1	0,14	192	26,6	-	-

\* przy współpracy technicznej p. Grażyny Dutkiewicz

c.d. tab. I

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Katowickie	245446	6206,4	13	0,33	3626	91,7	3	0,08
15. Kieleckie	89826	7910,6	5	0,44	4183	368,5	1	0,09
16. Konińskie	20154	4232,3	-	-	464	97,1	-	-
17. Koszalińskie	16726	3244,9	1	0,19	1305	251,7	-	-
18. M. krakowskie	131599	10668,5	-	-	71	5,7	-	-
19. Krośnieńskie	25893	5152,5	-	-	1140	226,0	1	0,20
20. Legnickie	80122	15379,2	6	1,15	1836	351,3	1	0,19
21. Leszczyńskie	25080	6374,3	2	0,51	3552	900,0	-	-
22. Lubelskie	58054	5678,6	3	0,29	2553	249,1	1	0,10
23. Łomżyńskie	24402	6922,1	-	-	-	-	-	-
24. M. łódzkie	236345	20950,5	3	0,27	164198	14611,8	2	0,18
25. Nowosądeckie	35880	4991,2	5	0,70	1491	205,9	-	-
26. Olsztyńskie	34170	4470,9	2	0,26	1514	197,3	1	0,13
27. Opolskie	29276	2851,5	1	0,10	1618	157,5	1	0,10
28. Ostrołęckie	10994	2716,8	1	0,25	174	42,8	-	-
29. Piłskie	49335	10101,1	-	-	1400	285,3	-	-
30. Piotrkowskie	31883	4945,6	3	0,47	3352	519,8	3	0,47
31. Płockie	1447	278,0	-	-	304	58,3	-	-
32. Poznańskie	28484	2119,2	1	0,07	11485	851,4	1	0,07
33. Przemyskie	11275	2736,4	-	-	739	179,0	2	0,48
34. Radomskie	39689	5219,7	5	0,66	36	4,7	-	-
35. Rzeszowskie	62037	8412,1	3	0,41	12	1,6	2	0,27
36. Siedleckie	4633	703,6	-	-	480	72,7	-	-
37. Sieradzkie	38531	9356,1	1	0,24	1	0,2	1	0,24
38. Skierniewickie	24838	5872,4	-	-	741	175,0	-	-
39. Słupskie	17468	4135,2	-	-	452	106,5	-	-
40. Suwalskie	12223	2541,2	2	0,42	202	41,8	-	-
41. Szczecińskie	73582	7483,3	1	0,10	41287	4184,5	2	0,20
42. Tarnobrzeskie	19845	3268,4	2	0,33	1492	245,2	-	-
43. Tarnowskie	46664	6810,8	1	0,15	243	35,3	1	0,15
44. Toruńskie	30750	4616,4	-	-	7316	1094,0	-	-
45. Wałbrzyskie	72800	9814,9	1	0,14	9427	1271,8	-	-
46. Włocławskie	464	107,0	5	1,15	58	13,4	-	-
47. Wrocławskie	188654	16654,9	4	0,35	45437	4000,9	3	0,26
48. Zamojskie	23682	4799,0	1	0,20	2169	439,4	-	-
49. Zielonogórskie	21592	3232,4	-	-	3158	471,1	-	-

W 1994 r. zarejestrowano 30 zgonów z powodu grypy. Śmiertelność wyniosła 0,006% tj. dwukrotnie więcej niż w 1993 r. (0,003%). Większość zgonów (24) wystąpiła w lutym i marcu 1994 r. Zmarło 19 kobiet i 11 mężczyzn. W miastach wystąpiło 11 zgonów a na wsi 19. Umieralność wynosiła 0,078 na 100 000 (w miastach 0,046 i na wsi 0,129). Najwyższą umieralność stwierdzono w woj. przemyskim (0,48) i piotrkowskim (0,47). Zmarło 5 osób w wieku 15-59 lat i 25 osób w wieku powyżej 60 lat.

W 1994 r. mimo licznych materiałów od pacjentów nie udało się wyizolować wirusa grypy. Na podstawie badań serologicznych stwierdzono występowanie przeciwciał dla wirusów grypy typu A (H1N1), A(H3N2) i typu B.