

Wanda Szata

AIDS I ZAKAŻENIE HIV W 1995 ROKU*

AIDS W 1995 ROKU

W 1995 roku w Polsce odnotowano 111 przypadków AIDS. Liczba ta była największa od początku rejestracji zespołu (tab. I); przewyższała o 14 (o 14,4%) liczbę przypadków zarejestrowanych w 1994 r. oraz ponad trzykrotnie medianę za lata 1989-1993. Zapadalność wynosiła 0,3 na 100 000 mieszkańców i była tylko nieznacznie wyższa zarówno od zapadalności w 1994 r. (0,2) jak i od mediany za lata 1989-1993 (0,1).

Tabela I. Liczba zachorowań* i zgonów** chorych na AIDS w Polsce w latach 1986-1995 wg drogi przenoszenia zakażenia.

Rok	Zachorowania						Zgony					
	H-/Bi	N	He	I	Bd	ogółem	H-/Bi	N	He	I	Bd	ogółem
1986	1					1	1					1
1987	1		1			2	1		1			2
1988	2					2	2					2
1989	17	6	1			24	11	3				14
1990	13	5	3			21	8	1	3			12
1991	16	24	4	1	1	46	9	3			1	13
1992	12	19	2	2		35	13	11	4			28
1993	21	32	11	3	1	68	13	14	4	2	1	34
1994	28	48	12	5	4	97	24	17	6	3	4	54
1995	27	53	19	4	8	111	18	36	15	3	5	77
Razem	138	187	53	15	14	407	100	85	33	8	11	237

* wg roku rozpoznania; ** - wg daty zgonu;

H-/Bi - homo- i biseksualiści, N - zakażeni w związku ze stosowaniem środków odurzających,

He - zakażeni drogą kontaktów heteroseksualnych, I - inni, Bd - brak danych

Ponad jedną piątą (23) liczby zachorowań rozpoznanych w 1995 r. zgłoszono z opóźnieniem - do końca maja 1996 r. Ponadto w 1996 r. zgłoszono trzy zachorowania zdiagnozowane w roku 1994.

U chorych, u których rozpoznano AIDS w 1995 r., określono następujące choroby wskaźnikowe: kandydozę przełyku - u 38 osób, zespół wyniszczenia w przebiegu zakażenia HIV - u 19, encefalopatię związaną z zakażeniem HIV - u 18, gruźlicę płuc - u 17,

* dane uzupełniane do sierpnia 1996 r. włącznie.

zapalenie płuc wywołane przez *Pneumocystis carinii* – u 15, nawracające zapalenie płuc – u 13, toksoplazmozę mózgu – u 12, kandydozę oskrzeli, tchawicy lub płuc – u 7 oraz zapalenie siatkówki wywołane przez CMV – u 4 osób. Ponadto rozpoznano

– trzykrotnie: gruźlicę ze zmianami pozapłucnymi; mykobakteriozy inne niż wywołane przez *M. tuberculosis*, *M. avium complex* lub *M. kansasii*; nawracającą posocznicę wywołaną przez bakterie z rodzaju *Salmonella* (poza wywołującymi dur brzuszny i dury rzekome) oraz mięsaka *Kaposiego*;

– dwukrotnie: pozapłucną kryptokokozę, chłoniaka *Burkitta* oraz bliżej nieokreślone zakażenia oportunistyczne;

– jednokrotnie: zmiany wywołane przez *Herpes simplex*, inwazyjnego raka szyjki macicy oraz chłoniaka immunoblastycznego.

W 1995 roku w 52 przypadkach AIDS podano liczbę komórek CD4. U 25 chorych była ona niższa od $50/\mu\text{L}$, w 21 – wynosiła od 50 do 199 i w sześciu – równa lub większa niż 200, a maksymalna – $710/\mu\text{L}$.

Wśród chorych z AIDS rozpoznanym w 1995 r. przeważali narkomani (53 osoby; 47,7% ogółu chorych). Ponadto dwudziestu siedmiu chorych zakaziło się drogą kontaktów homo-/biseksualnych, dziewiętnastu drogą kontaktów heteroseksualnych, a cztery osoby to: biorczyni zakażonej krwi, chory na hemofilię i dwu mężczyzn, którzy wstrzyknęli sobie zakażoną krew; o pozostałych chorych brak jest informacji o drodze zakażenia HIV.

Zarejestrowano zachorowania 96 mężczyzn i 15 kobiet. Wiek chorych kształtował się następująco: 20–29 lat – 29 osób, 30–39 – 53 osoby, 40–49 – 19 osób, 50–59 – 8 i powyżej 60 lat – 2 osoby.

W 1995 r. odnotowano przypadki AIDS w 27 województwach: w granicach od jednego zachorowania – w ośmiu województwach, do 23 zachorowań (20,7% ogółu) – w woj. st. warszawskim (tab. III). Ponadto m.in. w woj. katowickim wystąpiło 17 przypadków, a w gdańskim – 16. W poszczególnych województwach, w których zarejestrowano AIDS, zapadalność wahała się od 0,1 (w woj. częstochowskim, opolskim, radomskim i toruńskim) do 1,1 na 100 000 mieszkańców w woj. gdańskim.

W 1995 r. zarejestrowano ogółem 77 zgonów chorych na AIDS. Była to – jak dotychczas – największa liczba zgonów odnotowana w jednym roku. Przewyższała liczbę zgonów w 1994 r. o 23 (o 42,6%), a medianę za lata 1989–1993 – ponad pięciokrotnie. W 1995 r. umieralność wynosiła 0,2 na 100 000 mieszkańców i była nieznacznie wyższa od umieralności w 1994 r. (0,1).

Zgony chorych na AIDS odnotowano w 21 województwach. Liczba zgonów wahała się od jednego (w sześciu województwach) do 17 w woj. st. warszawskim. Najwyższa była umieralność w woj. jeleniogórskim (0,8), a ponadto w woj. st. warszawskim i gdańskim (po 0,7 na 100 000 mieszkańców).

AIDS W LATACH 1986–1995

Od rozpoczęcia rejestracji do 31 grudnia 1995 r. rozpoznano w Polsce i zgłoszono do Zakładu Epidemiologii PZH ogółem 407 zachorowań na AIDS, mieszczących się w następujących kategoriach: zakażenie / – a oportunistyczne – u 345 osób, mięsaka *Kaposiego* – u 7, zakażenie / – a oportunistyczne i mięsaka *Kaposiego* – u 7, chłoniak

– u 5, encefalopatia związana z zakażeniem HIV – u 17, zespół wyniszczenia w przebiegu zakażenia HIV – u 25 osób oraz rak inwazyjny szyjki macicy – u 1 osoby.

Wśród 407 chorych na AIDS rozpoznanych w latach 1986–1995 najczęściej było narkomanów i znaczną grupę stanowili homo- i biseksualiści (odpowiednio: 45,9% i 33,9% ogółu); 13,0% ogółu chorych stanowili zakażeni drogą kontaktów heteroseksualnych. Wśród ogółu chorych przeważali mężczyźni (87,0%) (tab. II), osoby w wieku 30–39 lat (43,7%) oraz osoby mające adres stałego miejsca zamieszkania w woj. st. warszawskim (34,4%, tab. III).

Tabela II. Zachorowania na AIDS w Polsce w latach 1986–1995. Podział wg płci, wieku* i drogi przenoszenia zakażenia.

Wiek* (lata)	Płeć			Droga przenoszenia zakażenia					
	M	K	ogółem	H-/Bi	N	He	I	Bd	ogółem
<20	4	3	7		2		5		7
20–29	82	23	105	17	73	8	5	2	105
30–39	157	21	178	54	94	21	2	7	178
40–49	76	2	78	40	18	14	2	4	78
50–59	25	3	28	18		10			28
>60	10	1	11	9			1	1	11
Razem	354	53	407	138	187	53	15	14	407

* Dokładny wiek (lata) w chwili rozpoznania AIDS;

M – mężczyźni, K – kobiety, H-/Bi – homo- i biseksualiści, N – zakażeni w związku ze stosowaniem środków odurzających, He – zakażeni drogą kontaktów heteroseksualnych, I – inni, Bd – brak danych

Tabela III. AIDS w Polsce w latach 1986–1995. Zachorowania, zapadalność, zgony i umieralność. Podział wg województw*.

Województwo	Zachorowania							Zgony						
	Mediana 1989–1993		1994		1995		1986– 1995	Mediana 1989–1993		1994		1995		1986– 1995
	l.	zap.	l.	zap.	l.	zap.	l.	l.	um.	l.	um.	l.	um.	l.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Polska	35	0,1	97	0,2	111	0,3	407	14	0,0	54	0,1	77	0,2	237
1. St. warszawskie	14	0,6	40	1,7	23	0,9	140	7	0,3	26	1,1	17	0,7	79
2. Białkopodlaskie	–	–	1	0,3	1	0,3	2	–	–	–	–	1	0,3	1
3. Białostockie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. Bielskie	0	0,0	2	0,2	2	0,2	7	0	0,0	1	0,1	2	0,2	5
5. Bydgoskie	1	0,1	8	0,7	5	0,4	21	1	0,1	2	0,2	4	0,3	10
6. Chełmskie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Ciechanowskie	0	0,0	–	–	–	–	1	0	0,0	–	–	–	–	1
8. Częstochowskie	–	–	–	–	1	0,1	1	–	–	–	–	–	–	–
9. Elbląskie	1	0,2	–	–	1	0,2	4	0	0,0	–	–	–	–	2
10. Gdańskie	1	0,1	8	0,6	16	1,1	36	1	0,1	4	0,3	10	0,7	21
11. Gorzowskie	–	–	–	–	1	0,2	1	–	–	–	–	1	0,2	1

c.d. tab. III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12. Jeleniogórskie	0	0,0	4	0,8	3	0,6	10	0	0,0	-	-	4	0,8	6
13. Kaliskie	0	0,0	-	-	-	-	1	0	0,0	-	-	-	-	1
14. Katowickie	1	0,0	8	0,2	17	0,4	39	1	0,0	4	0,1	11	0,3	26
15. Kieleckie	0	0,0	2	0,2	-	-	3	0	0,0	2	0,2	-	-	3
16. Konińskie	-	-	-	-	1	0,2	1	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	1	0,2	2	0,4	3	-	-	1	0,2	1	0,2	2
18. M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	0	0,0	-	-	3	0,6	5	-	-	-	-	2	0,4	2
21. Leszczyńskie	0	0,0	-	-	2	0,5	3	-	-	-	-	2	0,5	2
22. Lubelskie	0	0,0	1	0,1	2	0,2	4	0	0,0	1	0,1	2	0,2	4
23. Łomżyńskie	0	0,0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
24. M. łódzkie	2	0,2	2	0,2	2	0,2	14	2	0,2	1	0,1	-	-	11
25. Nowosądeckie	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	0	0,0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	1	0,1	2	0,2	1	0,1	6	0	0,0	-	-	1	0,1	2
28. Ostrołęckie	0	0,0	1	0,2	-	-	2	-	-	1	0,2	-	-	1
29. Piłskie	-	-	1	0,2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	3	0,5	3	-	-	-	-	3	0,5	3
31. Płockie	0	0,0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	0	0,0	-	-	3	0,2	4	0	0,0	-	-	3	0,2	4
33. Przemyskie	0	0,0	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
34. Radomskie	1	0,1	1	0,1	1	0,1	10	1	0,1	-	-	2	0,3	6
35. Rzeszowskie	0	0,0	-	-	-	-	1	0	0,0	-	-	-	-	1
36. Siedleckie	1	0,1	3	0,5	5	0,8	12	-	-	2	0,3	3	0,4	5
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	1	0,2	2	0,5	3	-	-	1	0,2	-	-	1
39. Słupskie	0	0,0	-	-	2	0,5	3	0	0,0	-	-	1	0,2	2
40. Suwalskie	0	0,0	-	-	-	-	2	0	0,0	-	-	-	-	1
41. Szczecińskie	0	0,0	3	0,3	6	0,6	12	0	0,0	1	0,1	-	-	4
42. Tarnobrzeskie	0	0,0	-	-	-	-	1	0	0,0	-	-	-	-	1
43. Tarnowskie	0	0,0	-	-	-	-	2	-	-	1	0,1	-	-	1
44. Toruńskie	0	0,0	2	0,3	1	0,1	7	0	0,0	2	0,3	-	-	3
45. Wałbrzyskie	0	0,0	1	0,1	-	-	3	0	0,0	-	-	1	0,1	3
46. Włocławskie	0	0,0	-	-	-	-	1	-	-	1	0,2	-	-	1
47. Wrocławskie	3	0,3	4	0,4	3	0,3	23	3	0,3	1	0,1	4	0,3	15
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	1	0,1	1	0,1	2	0,3	10	0	0,0	2	0,3	2	0,3	5

* rejestrowanie wg adresu stałego miejsca zamieszkania; l – liczba, zap. – zapadalność na 100 000 mieszkańców, um. – umieralność na 100 000 mieszkańców; 0 – wystąpiły zachorowania lub zgony

W latach 1986–1995 stwierdzono AIDS u 53 kobiet. Najwięcej z nich (36) zakażyło się w związku ze stosowaniem środków odurzających, 11 – drogą kontaktów heteroseksualnych, a ponadto były wśród nich: dwie dziewczynki z matek zakażonych HIV, dwie biorczynie krwi, jedna kobieta biseksualna i jedna bez informacji o drodze zakażenia.

Wiek chorych kobiet był niższy niż mężczyzn, a wiek narkomanów niższy niż homo- i biseksualistów.

W latach 1986–1995 odnotowano AIDS w większości województw (42). Najwięcej zachorowań zarejestrowano w woj. st. warszawskim – 140, a ponadto m.in.: 39 – w woj. katowickim, 36 – w gdańskim, 23 – we wrocławskim i 21 – w bydgoskim; w 12 województwach zarejestrowano po jednym zachorowaniu.

W latach 1986–1995 zgłoszono ogółem z 36 województw 237 zgonów na AIDS. Liczba zgonów w poszczególnych województwach wahała się od jednego (w 12 województwach) do 79 w woj. st. warszawskim; 26 zgonów zarejestrowano w woj. katowickim, 21 w gdańskim i 15 we wrocławskim.

W latach 1986–1995 w 35,1% ogółu przypadków AIDS stwierdzono odstęp powyżej 3 lat między wykryciem zakażenia HIV a AIDS (tab. IV). W 1995 r. odsetek (52,2%) chorych o tak długim okresie przedchorobowym był większy niż we wszystkich poprzednich latach.

Tabela IV. AIDS w latach 1986–1995. Podział wg roku rozpoznania AIDS oraz czasu między stwierdzeniem zakażenia HIV i zachorowania na AIDS.

Rok rozpoznania AIDS	Czas między stwierdzeniem zakażenia HIV i zachorowaniem na AIDS				
	rozpoznanie równoczesne	poniżej 1 roku	rok do 3 lat	powyżej 3 lat	ogółem
1986–1988	5				5
1989	13	4	5	2	24
1990	8	9	3	1	21
1991	5	20	19	2	46
1992	5	11	10	9	35
1993	13	15	13	27	68
1994	18	9	26	44	97
1995	22	17	14	58	111
Razem	89	85	90	143	407

U zdecydowanej większości (80,6%) spośród 237 chorych na AIDS, którzy zmarli w latach 1986–1995, rozpoznano ten zespół w chwili zgonu lub przeżyli oni – od rozpoznania AIDS do zgonu – okres krótszy niż 1 rok. Pozostałe osoby (46) żyły po rozpoznaniu AIDS rok lub dłużej. Większość z nich (34 osoby) zmarła w ciągu dwu lat od postawienia rozpoznania. Najpóźniej – po czterech latach – zmarł narkoman, który w chwili rozpoznania AIDS miał 30 lat; obecność przeciwciał anti-HIV stwierdzono u niego prawie półtora roku przed rozpoznaniem AIDS.

ZAKAŻENIA HIV W 1995 R.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 1995 r. u obywateli polskich wykonano ogółem 1 102 640 badań przesiewowych w kierunku przeciwciał anti-HIV tj. o 19 714 mniej niż w 1994 r. (tab. V). Zbadano zbliżoną liczbę osób z grup szczególnie narażonych

na zakażenie HIV tzn.: homo-/biseksualistów, stosujących środki odurzające, trudniących się prostytutką, biorców krwi, nasienia, tkanek i narządów oraz chorych na hemofilię (1995 r. – 12 587, 1994 r. – 12 438). Lecz w 1995 r. liczba badań wykonanych wśród homo-/biseksualistów, zakażonych w związku ze stosowaniem środków odurzających i chorych na hemofilię była mniejsza niż w 1994 r. (odpowiednio o: 2,8%, 6,8% i 71,9%), a większa wśród osób trudniących się prostytutką oraz biorców krwi, nasienia, tkanek i narządów (odpowiednio o 21,7% i 21,5%).

Tabela V. Nowo wykryte zakażenia HIV w 1995 r.

Grupa badanych	Liczba			
	serologicznie dodatnich osób*		wykonanych badań**	serologicznie dodatnich osób na 100 wykonanych badań
	ogółem	odsetek ogółu zakażonych		
Homo- i biseksualiści	22	4,1	447	4,9
Zakażeni w związku ze stosowaniem środków odurzających	320	59,4	6 614	4,8
Osoby trudniące się prostytutką	1	0,2	539	0,2
Biorcy krwi, nasienia, tkanek i narządów	1	0,2	4 864	0,02
Chorzy na hemofilię	–	–	123	–
Osoby z w/w grup – razem	344	63,8	12 587	2,7
Dawcy krwi***	13	2,4	957 646	0,001
Inni/brak danych	182	33,8	132 407	×
Obywatele polscy ogółem	539	100,0	1 102 640	0,05
Obcokrajowcy	5	100,0	1 187	0,42

* bez MSW, PKP

** bez MON, MSW, PKP

*** wg danych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

W 1995 r. do Zakładu Epidemiologii PZH zgłoszono nowo wykryte zakażenie HIV 539 obywateli polskich – o 116 (o 27,4%) więcej niż w roku 1994. Wśród nich nadal przeważali zakażeni w związku ze stosowaniem środków odurzających (320 osób, 59,4% ogółu zakażonych). Było ich więcej niż w 1994 r. o 61 osób tj. o 23,6%. Nadal pozostawał wysoki odsetek osób bez informacji o drodze zakażenia (30,4% ogółu nowo wykrytych zakażeń). Ponadto wiadomo m.in., że co najmniej 16 osób uległo zakażeniu drogą kontaktów heteroseksualnych.

W 1995 r. (tab. V) liczba nowo wykrytych zakażeń na 100 wykonanych badań w kierunku przeciwciał anti-HIV, przeprowadzonych wśród homo- i biseksualistów była mniejsza niż w 1994 r., a wśród zakażonych w związku ze stosowaniem środków odurzających – większa.

W 1995 r. wśród nowo wykrytych zakażonych osób nadal większość stanowili mężczyźni – 76,6% ogółu zakażonych, 3,6 w proporcji mężczyzn na 1 kobietę; (413 mężczyzn, 116 kobiet, 10 osób bez informacji o płci). Różnica ta była nieco większa od odnotowanej w 1994 r.

Kobiety, u których w 1995 r. rozpoznano zakażenie HIV, w większości przypadków uległy zakażeniu w związku ze stosowaniem środków odurzających (75; 64,7% ogółu zakażonych kobiet). Ponadto było: 7 zakażonych drogą kontaktów heteroseksualnych, kandydatka na krwiodawczynię, kobieta trudniąca się prostytutką oraz jedno niespełna trzyletnie dziecko; o 31 kobietach brak informacji o drodze zakażenia.

W 1995 r. wśród zakażonych HIV nadal przeważały osoby młode, w wieku 20–29 lat (281 osób, 52,1% ogółu zakażonych). W pozostałych grupach wieku było: do 20 lat – 51 osób (dwoje dzieci w trzecim roku życia i 16–19-latk), 30–39 lat – 125, 40–49 lat – 43, 50–59 lat – 15 i powyżej 60 lat – jedna osoba; brak informacji o wieku 23 osób. Zakażone kobiety były młodsze niż mężczyźni; wśród kobiet 18,1% miało poniżej 20 lat, a 61,2% – od 20 do 29 lat.

W 1995 r. zgłoszono podejrzenie zakażenia HIV (wykryto przeciwciała anti-HIV) u dwanaścioro dzieci w wieku poniżej 18 miesięcy.

Serologicznie dodatnie osoby, u których wykryto zakażenie HIV w 1995 r., miały adresy stałego miejsca zamieszkania na terenie 38 województw (tab. VI). Najwięcej nowo wykrytych zakażeń odnotowano w woj. katowickim (71). U 151 osób (28,0%) brak informacji o miejscu zamieszkania.

Tabela VI. Nowo wykryte zakażenia HIV obywateli polskich – 1995 r.; podział wg województw* i grup zakażonych.

Województwo	Grupa zakażonych								Razem		
	H-/Bi	N	D	P	B	He	Dz	Bd	liczba	%	liczba na 100 tys. mieszkańców**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem	22	320	13	1	1	16	2	164	539	100,0	1,4
1. St. warszawskie	5	10	–	–	1	3	–	13	32	5,9	1,3
2. Białkopodlaskie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. Białostockie	–	1	–	–	–	–	–	4	5	0,9	0,7
4. Bielskie	–	5	–	–	–	–	–	4	9	1,7	1,0
5. Bydgoskie	–	4	–	–	–	–	–	2	4	0,7	0,4
6. Chełmskie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. Ciechanowskie	–	–	–	–	–	–	–	2	2	0,4	0,5
8. Częstochowskie	1	1	–	–	–	–	–	–	2	0,4	0,3
9. Elbląskie	–	6	–	–	–	–	–	2	8	1,5	1,6
10. Gdańskie	–	7	1	–	–	1	–	7	16	3,0	1,1
11. Gorzowskie	–	1	–	–	–	–	–	1	2	0,4	0,4
12. Jeleniogórskie	–	5	1	–	–	–	–	–	6	1,1	1,1
13. Kaliskie	–	3	–	–	–	–	–	3	6	1,1	0,8
14. Katowickie	2	45	2	–	–	1	1	20	71	13,2	1,8
15. Kieleckie	–	4	–	–	–	–	–	–	4	0,7	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. Konińskie	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0,2	0,2
17. Koszalińskie	1	1	-	-	-	-	-	2	4	0,7	0,8
18. M. krakowskie	-	4	-	-	-	-	-	2	6	1,1	0,5
19. Krośnieńskie	-	-	1	-	-	-	-	2	3	0,6	0,6
20. Legnickie	-	11	-	-	-	-	-	3	14	2,6	2,7
21. Leszczyńskie	-	2	-	-	-	2	-	-	4	0,7	1,0
22. Lubelskie	-	27	-	-	-	-	-	6	33	6,1	3,2
23. Łomżyńskie	1	4	-	-	-	-	-	-	5	0,9	1,4
24. M. łódzkie	3	12	1	-	-	1	-	3	20	3,7	1,8
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	-	12	-	-	-	-	-	2	14	2,6	1,4
28. Ostrołęckie	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0,2	0,3
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0,2	0,2
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	2	1	-	-	2	1	5	11	2,0	0,8
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0,2	0,1
35. Rzeszowskie	-	2	1	-	-	-	-	-	3	0,6	0,4
36. Siedleckie	1	-	-	-	-	1	-	2	4	0,7	0,6
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0,2	0,2
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	1	-	-	-	-	-	2	3	0,6	0,6
41. Szczecińskie	2	24	1	-	-	-	-	1	28	5,2	2,8
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0,4	0,3
43. Tarnowskie	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0,2	0,1
44. Toruńskie	-	8	-	-	-	-	-	-	8	1,5	1,2
45. Wałbrzyskie	-	10	2	-	-	-	-	2	14	2,6	1,9
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	1	16	1	-	-	1	-	6	25	4,6	2,2
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	9	1	-	-	-	-	4	14	2,6	2,1
Brak adresu	4	79	-	1	-	4	-	63	151	28,0	×

* rejestrowanie wg adresu stałego miejsca zamieszkania; H-/Bi – homo- i biseksualiści; N – zakażeni HIV w związku ze stosowaniem środków odurzających; D – dawcy krwi; B – biorcy krwi; P – osoby trudniące się prostytutką; He – zakażeni drogą kontaktów heteroseksualnych; Dz – dzieci; Bd – brak danych

** ludność – stan w dniu 30.06.1995 r.; dane GUS

Liczba nowo wykrytych zakażeń na 100 000 mieszkańców wynosiła w Polsce 1,4 (w 1994 r. – 1,1). W poszczególnych województwach z odnotowanymi zakażeniami wahała się od 0,1 w woj. radomskim i tarnowskim do 3,2 w woj. lubelskim. Ponadto była wyższa od przeciętnej ogólnopolskiej w woj. szczecińskim (2,8) i w grupie województw pld.-zach. Polski.

PODSUMOWANIE

Obserwuje się wzrost liczby zachorowań na AIDS i zgonów osób chorych na AIDS. Zachorowania występują na coraz większym obszarze Polski. Te tendencje prawdopodobnie będą się nadal utrzymywać.

W 1990 r. odnotowano największą – jak dotychczas – liczbę nowo wykrytych zakażeń HIV. W latach 1991–1995 liczba ta wahała się od 384 (w 1993 r.) do 559 (w 1991 r.). Zwraca uwagę częstsze występowanie zakażeń HIV także na obszarach Polski innych niż poprzednio.