

Krzysztof Kuszewski, Lidia Brydak

GRYPA W 1996 ROKU

W 1996 roku zarejestrowano w Polsce 2711 174 zachorowania na grypę. Liczba zachorowań w porównaniu do roku 1995 wzrosła o 1 588 258, a więc ponad 2-krotnie.

Najwyższa zapadalność (powyżej 10 000 na 100 000 mieszkańców) wystąpiła w woj. m. łódzkim (18 687,1), warszawskim (14 512,2), leszczyńskim (11 307,8), wrocławskim (10 848,0) i olsztyńskim (10 625,0). Najniższą zapadalność odnotowano w woj. konińskim (126,5), co wydaje się być niewiarygodne ze względu na 55-krotną różnicę w stosunku do średniej zapadalności w Polsce, która wyniosła 7 020,5 na 100 000 (tab. I).

Tabela I. Grypa w Polsce w latach 1995-1996 wg województw.

Zachorowania, zapadalność na 100 000, liczba zgonów, umieralność na 100 000.

Województwo	1995				1996			
	liczba zachorowań	zapadalność na 100 000	liczba zgonów	umieralność na 100 000	liczba zachorowań	zapadalność na 100 000	liczba zgonów	umieralność na 100 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
POLSKA	1 122 916	2 910,0	66	0,17	2 711 174	7 020,5	212	0,55
1. St. warszawskie	333 734	13 816,3	7	0,29	350 595	14 512,2	23	0,95
2. Białkopodlaskie	5 282	1 707,2	-	-	12 134	3 922,8	-	-
3. Białostockie	223	31,9	1	0,14	59 380	8 478,4	3	0,43
4. Bielskie	32 331	3 527,4	-	-	89 148	9 691,7	10	1,09
5. Bydgoskie	5 432	480,3	2	0,18	67 196	5 932,9	5	0,44
6. Chełmskie	17	6,8	-	-	7 297	2 920,5	-	-
7. Ciechanowskie	84	19,2	3	0,69	21 570	4 944,6	2	0,46
8. Częstochowskie	8 363	1 069,4	2	0,26	49 343	6 311,8	4	0,51
9. Elbląskie	1 104	224,8	-	-	25 990	5 281,9	2	0,41
10. Gdańskie	17 247	1 187,6	-	-	131 458	9 016,9	4	0,27
11. Gorzowskie	24 527	4 810,5	-	-	13 138	2 569,8	1	0,20
12. Jeleniogórskie	21 991	4 195,4	2	0,38	15 874	3 028,0	3	0,57
13. Kaliskie	14 003	1 940,7	1	0,14	69 020	9 558,0	2	0,28
14. Katowickie	28 084	714,1	7	0,18	309 327	7 886,9	37	0,94
15. Kieleckie	15 431	1 358,3	2	0,18	38 897	3 425,4	8	0,70
16. Konińskie	1 548	323,1	-	-	607	126,5	-	-
17. Koszalińskie	530	101,7	-	-	18 872	3 610,9	1	0,19
18. M. krakowskie	71 264	5 748,2	2	0,16	116 329	9 364,4	4	0,32
19. Krośnieńskie	5 726	1 131,6	-	-	25 981	5 122,4	4	0,79
20. Legnickie	31 921	6 102,0	-	-	48 944	9 329,0	-	-
21. Leszczyńskie	31 027	7 822,7	-	-	44 949	11 307,8	2	0,50
22. Lubelskie	2 107	205,4	1	0,10	42 554	4 144,1	5	0,49
23. Łomżyńskie	337	95,3	3	0,85	21 459	6 067,5	4	1,13

c.d. tab. I

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. M.łódzkie	204 357	18274,7	–	–	208 048	18 687,1	5	0,45
25. Nowosądeckie	1 566	214,4	5	0,68	46 967	6 388,0	8	1,09
26. Olsztyńskie	2 314	300,3	–	–	82 137	10 625,0	2	0,26
27. Opolskie	9 115	887,9	3	0,29	73 777	7 200,7	11	1,07
28. Ostrołęckie	1 402	343,7	–	–	27 903	6 825,2	3	0,73
29. Piłskie	17 243	3 498,8	–	–	18 162	3 671,2	6	1,21
30. Piotrkowskie	5 279	819,6	1	0,16	40 784	6 336,3	7	1,09
31. Płockie	142	27,2	–	–	40 111	7 687,0	–	–
32. Poznańskie	25 494	1 885,6	7	0,52	25 524	1 883,9	2	0,15
33. Przemyskie	532	128,5	1	0,24	7 334	1 767,6	–	–
34. Radomskie	2 626	344,2	1	0,13	32 809	4 295,4	3	0,39
35. Rzeszowskie	2 726	365,9	–	–	18 402	2 462,9	–	–
36. Siedleckie	503	76,0	–	–	13 359	2 019,0	–	–
37. Sieradzkie	133	32,3	1	0,24	26 839	6 502,2	7	1,70
38. Skierniewickie	677	159,8	–	–	39 951	9 428,8	4	0,94
39. Słupskie	2 644	621,5	2	0,47	19 443	4 555,4	–	–
40. Suwańskie	1 029	212,1	1	0,21	33 651	6 916,3	1	0,21
41. Szczecińskie	15 179	1 533,7	4	0,40	31 733	3 201,1	3	0,30
42. Tarnobrzeskie	2 308	378,9	1	0,16	18 979	3 115,1	1	0,16
43. Tarnowskie	34 581	4 999,8	4	0,58	38 466	5 538,4	8	1,15
44. Toruńskie	8 332	1 243,0	–	–	37 043	5 513,8	3	0,45
45. Wałbrzyskie	18 862	2 548,7	–	–	50 016	6 774,1	1	0,14
46. Włocławskie	687	158,0	–	–	24 683	5 675,3	4	0,92
47. Wrocławskie	86 351	7 592,9	2	0,18	123 434	10 848,0	4	0,35
48. Zamojskie	8 415	1 705,1	–	–	10 739	2 182,0	1	0,20
49. Zielonogórskie	18 106	2 689,9	–	–	40 818	6 049,4	4	0,59

Inne województwa o najniższej zapadalności odnotowały powyżej 1 000 zachorowań na 100 000 mieszkańców i tak: przemyskie – 1 767,6; poznańskie – 1 883,9; siedleckie – 2 019,0; zamojskie – 2 182,0; rzeszowskie – 2 462,9; czy chełmskie – 2 920,5.

Liczba zgonów ogółem wyniosła 212 zaś umieralność 0,55 na 100 000. Oznacza to blisko 3,5-krotny wzrost liczby zgonów i umieralności w stosunku do roku 1995. Zmarły 124 kobiety i 88 mężczyzn.

Najwyższą umieralność odnotowano w woj. sieradzkim – 1,70; piłskim – 1,21; tarnobrzeskim – 1,16 i tarnowskim – 1,15.

Zachorowania dzieci w wieku do 14 lat wynosiły 1 010 335, co stanowi 37% zachorowań ogółem. Zapadalność w tej grupie wieku wynosiła 12 793,6/100 000.

Hospitalizowano 3 259 osób, w tym 1 231 dzieci, co stanowiło 4-krotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

W pierwszej połowie stycznia 1996 roku w Zakładzie Wirusologii PZH wyizolowano od dorosłych osób z Warszawy siedem szczepów wirusa grypy A (H3N2). Wyizolowane szczepy były spokrewnione ze szczepami A/Johannesburg/73/94 i A/Tessalonika/1/95. W drugiej połowie stycznia 1996 r. w WSSE Kraków wyizolowano jeden szczep wirusa grypy typu B od 65-letniego pacjenta. Szczep grypy typu B wykazywał pokrewieństwo antygenowe do szczepu B/Harbin/7/94.

Ogółem w 1996 roku wyizolowano w Polsce 8 szczepów wirusa grypy.