

Joanna Bogusz, Iwona Paradowska-Stankiewicz

MEASLES IN POLAND IN 2017*

ODRA W POLSCE W 2017 ROKU*

National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene
Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

ABSTRACT

INTRODUCTION. Since 1998 Poland has endorsed measles elimination programme which is coordinated by the World Health Organization (WHO). To accomplish measles elimination in the country, achievement of vaccination coverage at 95% in the population is needed, as is the monitoring of the epidemiological situation, i.e.: reporting on cases suspected of measles and conducting laboratory diagnostics in WHO Reference Laboratory. Polish Reference Laboratory is located at the Department of Virology NIPH-NIH.

OBJECTIVES. The aim of the article is to analyze the epidemiological situation of measles in Poland in 2017 with presenting the measles vaccination coverage and the progress of the measles elimination programme in Poland.

MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation of measles in Poland was analyzed on the basis of the case-based questionnaires of cases suspected of measles sent to NIPH-NIH by the Sanitary and Epidemiological Stations, data from the publications: “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2017” and “Vaccinations in Poland in 2017”.

RESULTS. In 2017, 63 cases of measles were notified to the surveillance system in Poland (incidence 0,16 per 100 000 population). The highest incidence was observed in the age 5 and was estimated at 1.27 per 100 000 population. Out of all cases, 38 (60.3%) were hospitalized. No fatal cases due to the measles were reported. In 2017 the maintenance of high vaccination coverage among children aged 2 and 12 years old was observed - from 92.9% to 99.3% (primary vaccination, children born in 2010-2016) and from 92.4% to 97.8% (booster vaccination, children born in 2004-2009).

CONCLUSIONS. The epidemiological situation of measles in 2017 in comparison with the situation in 2016, has improved. Irrespective of that, the vaccination coverage was sustained at the satisfactory level. In order to achieve the improvement of the measles surveillance system, promoting of the measles elimination programme among the physicians is necessary with focusing on the necessity to report and laboratory confirm all measles cases and the cases suspected of measles.

Key words: *measles , epidemiology, Poland 2017*

STRESZCZENIE

WSTĘP. Odra od 1998 r. objęta jest programem eliminacji koordynowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Eliminacja odry w kraju możliwa jest pod warunkiem osiągnięcia 95% poziomu zaszczepienia populacji, monitorowania sytuacji epidemiologicznej: rejestrowania wszystkich podejrzeń odry oraz prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium Referencyjnym WHO. Funkcję tę pełni Zakład Wirusologii NIZP-PZH.

CEL PRACY. Celem pracy jest analiza wskaźników epidemiologicznych odry w Polsce w 2017 r. z uwzględnieniem stanu zaszczepienia populacji przeciw odrze oraz stopnia realizacji programu eliminacji odry Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce.

MATERIAŁ I METODY. Analizę sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce przeprowadzono na podstawie jednostkowych zgłoszeń podejrzeń zachorowań na odrę nadesłanych do NIZP - PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarne – Epidemiologiczne, danych z biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2017 roku”.

*Article was written under the task No.6/EM/2018 ./ Praca została wykonana w ramach zadania nr6/EM/2018 r.

© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

WYNIKI. W 2017 r. zarejestrowano w Polsce 63 zachorowania na odrę (zapadalność 0,16 na 100 000). U najmłodszych dzieci w wieku 5 lat, odnotowano najwyższą zapadalność wynoszącą 1,27 na 100 000. Hospitalizowano 38 chorych (60,3%), nie zgłoszono żadnego zgonu z powodu odry. W 2017 r. utrzymywał się wysoki stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 12 lat, od 92,9% do 99,3% (szczepienie podstawowe, roczniki 2010-2016) oraz od 92,4% do 97,8% (szczepienie przypominające, roczniki 2004-2009).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Wskaźniki epidemiologiczne odry w 2017 r. w stosunku do 2016 r. poprawiły się. Pomimo, iż stan zaszczepienia populacji utrzymywał się na zadowalającym poziomie, w celu poprawy wskaźników jakości nadzoru nad odrą w Polsce celowe jest propagowanie programu eliminacji odry wśród lekarzy, podkreślając konieczność dokumentowania i laboratoryjnego potwierdzania wszystkich przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę.

Słowa kluczowe: *odra, epidemiologia, Polska 2017 rok*

INTRODUCTION

The measles is a disease that since 1988 has been the subject of integrated activities undertaken at the initiative of the World Health Organization (WHO) aimed at eliminating and then eradicating (1). The term “elimination” in relation to measles means a situation in which there is no endemic spreading of the disease, and in the case of virus reintroduction, the transmission of infections is not sustained. Achieving such a state requires:

- maintaining the level of inoculation of the population with two doses of vaccine at the level of 95% (obtaining community resistance),
- assessment of the percentage of vulnerable people in the population based on serological tests,
- permanent monitoring of the epidemiological situation, including recording all suspected measles and laboratory diagnostics for all measles suspected (2-3).

In Poland, as a part of the measles elimination program, all measles suspicions are reported and registered. Each of the suspicions should be confirmed / excluded by the determination of the level of specific antibodies in the IgM class or isolation of the virus from the biological material in the reference laboratory, accredited by the WHO (Laboratory of the Department of Virology NIZP - PZH). In order to detect antibodies in the IgM class, the material should be collected after 7 days from the onset of the rash (up to 45 days after the onset of the disease). However, in order to isolate the virus or carry out a molecular examination (PCR), the material should be collected within 1-4 days of the appearance of the rash. Molecular examination is used to identify the source and route of infection (4-5).

Before the introduction of vaccination for measles, they were commonplace. Epidemics occurred every 2-3 years. In Poland, before the introduction of measles vaccinations (sixties), the number of registered cases ranged from 70 000 to 130 000 in years between epidemics and from 135 000 to 200 000 in epidemic years (6).

WSTĘP

Odra jest chorobą, która od roku 1998 jest przedmiotem zintegrowanych działań podejmowanych z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ukierunkowanych na eliminację, a następnie eradykację (1). Termin „eliminacja” w odniesieniu do odry oznacza sytuację, w której nie występuje endemiczne szerzenie się zachorowań, zaś w przypadku reintrodukcji wirusa (zawleczenie), transmisja zakażeń nie jest podtrzymana. Osiągnięcie takiego stanu wymaga:

- utrzymania poziomu zaszczepienia populacji dwiema dawkami szczepionki na poziomie 95% (uzyskanie odporności zbiorowiskowej),
- oceny odsetka osób wrażliwych w populacji na podstawie badań serologicznych,
- stałego monitorowania sytuacji epidemiologicznej, w tym rejestrowania wszystkich podejrzeń w kierunku odry i diagnostyki laboratoryjnej prowadzonej wobec wszystkich podejrzeń odry (2-3).

W Polsce w ramach programu eliminacji odry zgłaszaniu i rejestrowaniu podlegają wszystkie podejrzenia odry. Każde z podejrzeń powinno być potwierdzone / wykluczone przez oznaczenie poziomu swoistych przeciwciał w klasie IgM lub izolację wirusa z materiału biologicznego w laboratorium referencyjnym, akredytowanym przez WHO (laboratorium Zakładu Wirusologii NIZP - PZH). W celu wykrycia przeciwciał w klasie IgM materiał do badania należy pobrać po upływie 7 dni od pojawienia się wysypki (do 45 dni po zachorowaniu). Natomiast w celu izolacji wirusa lub wykonania badania molekularnego (PCR), materiał należy pobrać w okresie 1-4 dni od pojawienia się wysypki. Badanie molekularne jest stosowane do identyfikacji źródła i drogi transmisji zakażenia (4-5).

Przed wprowadzeniem szczepień zachorowania na odrę były powszechne. Epidemie występowały co 2-3 lata. W Polsce przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze (w latach sześćdziesiątych) liczba rejestrowanych przypadków kształtowała się od 70 000 do 130 000 w latach pomiędzy epidemiami oraz od 135 000 do 200 000 w latach epidemicznych (6). Szczepionka prze-

The measles vaccine comes in a combined (conjugated) form as a measles, mumps and rubella vaccine (so-called MMR). It includes live, weakened viruses. It does not contain adjuvants. Vaccination against measles belongs to the compulsory vaccination, entered into the annual calendar of vaccinations, administered in Poland in 13-14 months of age and 10 years of age. The vaccination effectiveness after 2 doses of vaccine is 98-99% (7).

OBJECTIVES

The aim of the work is to assess the epidemiological situation of measles in Poland in 2017 and its comparison to previous years, including the status of vaccination against measles.

In addition, the work aims to present the degree of implementation of the WHO measles eradication program, taking as a benchmark the sensitivity indicators of surveillance developed by the World Health Organization and assumptions (mentioned in the introduction) that are crucial for achieving the elimination of disease.

MATERIAL AND METHODS

The analysis of the epidemiological situation of measles in Poland in 2017 was carried out based on individual case reports/suspicions on measles sent to NIZP-PZH by Voivodship Sanitary and Epidemiological Stations and data from the annual bulletin "Infectious diseases and poisoning in Poland" in 2017 (8).

The analysis of the state of population immunization in 2017 was based on data from the annual bulletin "Protective vaccinations in Poland in 2017" (9). According to the definition of the case of measles: clinical criteria are met by every person with fever and maculopapular rash, and at least one of the following three criteria: cough, rhinitis, conjunctivitis. The laboratory criteria are based on the fulfillment of at least one of the following four criteria:

- isolation of measles virus from clinical material,
- detection of measles virus nucleic acid in a clinical specimen,
- the presence of specific antibodies against the measles virus in the blood or saliva, characteristic of acute infection (IgM),
- detection of the measles virus antigen in the clinical specimen by direct immunofluorescence (DFA) using specific monoclonal antibodies. The interpretation of laboratory tests results should take into account previous measles vaccination. If

ciw odrze występuje w postaci połączonej (skoniugowanej) jako szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. MMR). W jej skład wchodzi żywe, osłabione wirusy. Nie zawiera adiuwantów. Szczepienie przeciw odrze należy do szczepień obowiązkowych, wpisanych w coroczny Kalendarz Szczepień, podawanych w Polsce w 13-14 mies. życia oraz 10 roku życia. Skuteczność szczepienia po podaniu 2 dawek szczepionki wynosi 98-99% (7).

CEL PRACY

Celem pracy jest analiza wskaźników epidemiologicznych odry w Polsce w 2017 roku oraz stanu zaszczepienia przeciw odrze w populacji polskiej. Ponadto praca ma na celu przedstawienie stopnia realizacji programu eliminacji odry WHO przyjmując za punkt odniesienia wskaźniki czułości nadzoru opracowane przez Światową Organizację Zdrowia oraz założenia (wymienione we wstępie), kluczowe dla osiągnięcia eliminacji choroby.

MATERIAŁ I METODY

Analizę sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce w 2017 r. przeprowadzono na podstawie indywidualnych formularzy zgłoszeń przypadków/podejrzeń zachorowań na odrę nadesłanych do NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne oraz danych pochodzących z rocznego biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku” (8).

Analizę stanu uodpornienia populacji w roku 2017 przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z rocznego biuletynu „Szczepienia ochronne w Polsce w 2017 roku” (9). Zgodnie z brzmieniem definicji przypadku odry: **kryteria kliniczne** spełnia każda osoba, u której występuje gorączka oraz wysypka plamisto-grudkowa, oraz co najmniej jedno z następujących trzech kryteriów: kaszel, nieżyt śluzowy nosa, zapalenie spojówek. **Kryteria laboratoryjne opierają się na** spełnieniu co najmniej jednego z następujących czterech kryteriów:

- izolacji wirusa odry z materiału klinicznego,
- wykrycia kwasu nukleinowego wirusa odry w materiale klinicznym,
- wykazania obecności swoistych przeciwciał przeciw wirusowi odry w surowicy krwi lub ślinie, charakterystycznych dla ostrej infekcji (IgM),
- wykrycia w materiale klinicznym antygenu wirusa odry metodą immunofluorescencji bezpośredniej (DFA) z użyciem swoistych przeciwciał monoklonalnych odry.

W interpretacji wyników testów laboratoryjnych należy wziąć pod uwagę przebyte szczepienie przeciw odrze. Jeżeli dana osoba została zaszczepiona niedawno,

a person has recently been vaccinated, it must be examined if there is a wild-type infection.

- Epidemiological criteria are met at the time of establishing an epidemiological link involving the transmission of infection from person to person.

Applied case classification:

A. A possible case - every person who meets clinical criteria.

B. Probable case - each person meeting clinical and epidemiological criteria.

C. Confirmed case - every person who has recently been vaccinated against measles and meets clinical and laboratory criteria. In case of recent vaccination: any person who has been detected in a wild-type measles virus (10).

należy zbadać, czy doszło do zakażenia dzikim wirusem. **Kryteria epidemiologiczne** spełnione są w momencie stwierdzenia powiązania epidemiologicznego polegające na przeniesieniu zakażenia z człowieka na człowieka.

Stosowana klasyfikacja przypadków obejmuje:

A. **Przypadek możliwy**- każda osoba spełniająca kryteria kliniczne.

B. **Przypadek prawdopodobny**-każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne.

C. **Przypadek potwierdzony** - każda osoba, która w ostatnim czasie nie była szczepiona przeciw odrze oraz spełnia kryteria kliniczne i laboratoryjne. W razie niedawnego szczepienia: każda osoba, u której wykryto dziki szczep wirusa odrzy (10).

RESULTS

Epidemiological situation of measles in 2017. The epidemiological situation of measles in 2017 as compared to the previous year was characterized by a significant decrease in the number of cases (2-fold decrease). In 2017, a total number of reported cases and suspected cases of measles was 63 (incidence 0.16 per 100.000) were registered in Poland. Measles cases were registered in 9 voivodeships (Tab. I).

WYNIKI

Sytuacja epidemiologiczna odrzy w roku 2017. Sytuacja epidemiologiczna odrzy w 2017 r. w porównaniu do roku poprzedniego, charakteryzowała się znacznym spadkiem liczby zachorowań (2-krotny spadek). W Polsce w 2017 r. odnotowano 63 przypadki zachorowań na odrę, zapadalność 0,16 na 100 000 ludności (w 2016 r. zarejestrowano 133 przypadki, zapadalność 0,35 na 100 000 ludności).

Table I. Measles in Poland during 2008-2017. Number of suspected and confirmed cases and incidence per 100 000 population by voivodeship

Tabela I. Odra w Polsce w latach 2008-2017. Liczba podejrzeń, potwierdzonych zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg województw

Voivodeship	Median 2008 - 2012				2016				2017			
	suspected cases		mesasles cases		suspected cases		mesasles cases		suspected cases		mesasles cases	
	number	incidence per 100 000	number	incidence per 100 000	number	incidence per 100 000	number	incidence per 100 000	number	incidence per 100 000	number	incidence per 100 000
POLSKA	127	0.33	70	0.18	148	0.37	133	0.35	262	0.68	63	0.16
1. Dolnośląskie	13	0.45	14	0.49	2	0.06	1	0.03	15	0.5	5	0.17
2. Kujawsko-pomorskie	6	0.29	2	0.10	4	0.19	1	0.05	12	0.2	0	0
3. Lubelskie	7	0.32	7	0.32	73	3.42	73	3.42	10	0.70	11	0.52
4. Lubuskie	1	0.10	1	0.10	1	0.10	0	0.00	18	0.60	0	0.00
5. Łódzkie	5	0.20	2.5	0.10	0	0.00	0	0.00	15	0.40	1	0.04
6. Małopolskie	7	0.21	3	0.09	3	0.06	2	0.06	24	0.20	3	0.09
7. Mazowieckie	22	0.42	10	0.19	35	0.60	30	0.56	33	0.58	11	0.20
8. Opolskie	2	0.20	3	0.29	0	0.00	0	0	10	1.20	0	0
9. Podkarpackie	4	0.19	3	0.40	3	0.14	0	0	22	0.40	0	0
10. Podlaskie	1	0.08	0	0.00	22	1.85	22	1.85	12	1.4	0	0
11. Pomorskie	1	0.04	1	0.04	0	0.00	0	0.00	10	0.50	2	0.09
12. Śląskie	10	0.22	5	0.11	2	0.04	1	0.02	15	0.40	2	0.04
13. Świętokrzyskie	1	0.08	1	0.08	0	0	0	0	9	0.3	0	0
14. Warmińsko-mazurskie	1	0.07	1	0.07	0	0.00	0	0	12	0.20	0	0
15. Wielkopolskie	11	0.32	9	0.27	2	0.06	2	0.06	22	0.30	26	0.75
16. Zachodniopomorskie	2	0.09	1	0.06	1	0.06	1	0.06	23	0.28	2	0.12

The highest number of cases occurred in Wielkopolskie voivodeships (26 cases in each, incidence respectively 0.75 per 100,000). In 2017, 6 measles outbreaks were reported in four voivodeships (the biggest one in Wielkopolskie voivodeships - 22 people,

Zachorowania na odrę odnotowano w 9 województwach (Tab.1). Najwięcej zachorowań wystąpiło w województwie wielkopolskim (26 zachorowań, zapadalność 0,75 na 100 000). W 2017 r. wystąpiło 6 ognisk, na terenie 4 województw (wielkopolskiego, mazowiec-

which is 16.5% registered cases in 2017). In total, 37 cases were registered in outbreaks.

The highest incidence rate was observed among children from 1 year old of age (1.3 per 100.000) and among children aged 5 years (1.27 per 100.000). Based on data from individual reports of cases, of 63 measles cases registered in 2017, 45 patients (71%) were unvaccinated, 12 patients (19 %) vaccinated in accordance with the current vaccination calendar. For 6 cases (9.5%) vaccination status was unknown.

In 2017, 38 cases of all registered ones (60.3 %) were hospitalized. No deaths from measles were reported.

Vaccinations against measles in 2017. The existing scheme of vaccination against measles remained unchanged since 2005 and consists of primary dose for children at 13-14 months and booster dose at 10 years of age. Live attenuated combined vaccine against measles, mumps and rubella (MMR) is used. In 2017, Poland maintained a high vaccination coverage of children. As of 31st December 2017, vaccination coverage of children and youth aged 2-12 years ranged from 92.9% to 99.3% (primary vaccination in children born in 2010-2016) and from 92.4% to 97.8% (booster dose in children born in 2004-2009) (Tab. II). As in previous years, differences between voivodeships in performance of primary vaccination in children at 13-14 months of age were observed. Percentage of children born in 2016 and 2017 vaccinated with trivalent vaccine against measles, mumps and rubella (74.9% in Poland).

kiego, lubelskiego, dolnośląskiego). Największe ognisko było w województwie wielkopolskim – 22 osoby (16,5% wszystkich zgłoszonych przypadków). W ogniskach odnotowano 37 przypadków zachorowań.

Najwyższą zapadalność odnotowano wśród dzieci od 1. roku życia (1,3 na 100 000) oraz wśród dzieci w wieku 5 lat (1,27 na 100 000). Analiza danych pochodzących z indywidualnych zgłoszeń wskazywała, że wśród 63 chorych 45 (71%) stanowiły osoby nieszczone, 12 (19%) osoby zaszczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień oraz 6 (9,5%) o nieznanym statusie zaszczepienia. Hospitalizowanych było 38 osób (60,3%). W 2017 r. nie odnotowano zgonu z powodu odrzy.

Wykonawstwo szczepień przeciw odrze w 2017 roku.

Od 2005 r. roku schemat szczepień przeciw odrze w Polsce pozostaje niezmienny, obejmuje podanie pierwszej (podstawowej) dawki w 13-14 miesiącu życia oraz dawki przypominającej w 10 roku życia. Stosuje się żywą, atenuowaną, skojarzoną szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) podawaną podskórną. W 2017 r. utrzymano wysoki stan zaszczepienia dzieci. W dniu 31 grudnia 2017 r. stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 12 lat był w granicach od 92,9% do 99,3% (szczepienie podstawowe, roczniki 2010-2016) oraz od 92,4% do 97,8% (szczepienie przypominające, roczniki 2004-2009) (Tab. II). Od kilku lat utrzymują się międzywojewódzkie różnice w wykonawstwie szczepień podstawowych u dzieci w 13-14 miesiącu życia. W 2017 r. odsetek dzieci z roczników 2015 oraz 2016, objętych szczepieniem podstawowym szczepionką MMR wyniósł 74,9% w skali kraju.

Table II. Number and percentage of children vaccinated against measles in Poland 2017 according to to birth year (primary and booster vaccinations)

Tabela II. Liczba i odsetek dzieci zaszczepionych przeciw odrze w Polsce w 2017 wg roku urodzenia (pierwsza i druga dawka)

Year of birth	As of 31th December 2012		As of 31th December 2013		As of 31th December 2014		As of 31th December 2015		As of 31th December 2016		As of 31th December 2017	
	number	% of children vaccinated	number	% of children vaccinated	number	% of children vaccinated	number	% of children vaccinated	number	% of children vaccinated	number	% of children vaccinated
Primary dose												
2009	404 820	98.9	405 744	99.1	404 026	99.4	404 310	99.4	404 410	99.4	404 549	99.5
2010	395 336	97.9	398 282	98.7	399 431	99.1	398 001	99.1	397 686	99.2	400 128	99.3
2011	318 126	83.6	370 876	97.5	374 312	98.7	375 672	98.8	374 750	99	376 502	99.1
2012	x	x	314 402	82.8	368 575	97.5	373 059	98.2	374 596	98.5	376 481	98.8
2013	x	x	x	x	287 371	82.8	347 449	96.3	351 974	97.5	356 170	98.2
2014	x	x	x	x	x	x	285 343	77.9	350 451	95.5	360 074	97.3
2015	x	x	x	x	x	x	x	x	283 040	74.9	353 953	96.0
2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	351 587	92.9
				BOSTER	DOSE							
2003	255 409	98.4	260 467	77.3	274 886	81.8	297 083	88.9	320 030	97.2	327 252	98.0
2004	333 594	98.6	309 837	93.2	316 426	95.3	319 125	96.2	327 583	97.3	310 115	97.8
2005	344 882	98.4	343 371	98.6	270 535	77.7	327 171	94.1	334 162	96.3	336 935	97.5
2006	x	x	x	x	x	x	257 839	71.5	336 060	93.4	347 522	96.6
2007	x	x	x	x	x	x	x	x	282 160	74.9	359 165	95.3
2008	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	371 687	92.4
2009	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

According to the Immunization Calendar, the vaccine is given twice, the first dose at 2 years of age (13-14 months), and the booster at 10 years of age. In 2017, the vaccination level against measles in children of 3 years of age dropped by 1.5% compared to the previous year and amounted to 94.0% across Poland (Tab. 2). Among 63 measles patients registered in 2017, 8 people (12.6%) received one dose, 3 people (4.7%) received two doses of MMR vaccine, 45 (71.4%) people were not vaccinated at all. In 6 people (9.5%) there was no information about vaccinations.

Measles Elimination Program implementation status in 2017. WHO European Region measles elimination strategy requires maintaining a sensitive and timely surveillance of measles and measles compatible cases, with serologic testing of at least one suspect case per 100.000 population. Over time, a decrease in number of confirmed measles cases should be accompanied by an increase in the number of notified and laboratory tested suspected cases of measles. In Poland in 2017, the number of reported suspected measles cases was lower than in 2016, with a total of 262 cases and suspected cases of measles were reported in Poland which constitutes 76 % of the expected reports (Fig. 1).

Według Kalendarza Szczepień Ochronnych szczepionkę podaje się dwukrotnie, pierwszą dawkę w 2. roku życia (13-14 miesiącu życia), a dawkę przypominającą w 10. roku życia. W 2017 roku poziom zaszczepienia przeciw odrze dzieci w 3 roku życia spadł o 1,5 % w porównaniu do poprzedniego roku i wynosił 94,0% w skali całej Polski (Tab.2). Wśród zarejestrowanych w 2017 r. 63 chorych na odrę, 8 osób (12,6%) otrzymało jedną dawkę, 3 osoby (4,7%) otrzymały dwie dawki szczepionki MMR, 45 (71,4%) osób w ogóle nie było szczepionych. U 6 osób (9,5%) brak było informacji o szczepieniach.

Realizacja Programu Eliminacji Odry w Polsce w 2017 roku. Zgodnie ze strategią eliminacji odry opracowaną przez Europejskie Biuro Regionalne WHO, wymagane jest wykonywanie diagnostyki serologicznej w kierunku odry dla minimum 1 przypadku na 100 000 mieszkańców. W miarę upływu czasu spadkowi liczby potwierdzonych zachorowań towarzyszyć powinien wzrost liczby zgłaszanych i weryfikowanych laboratoryjnie podejrzeń. W Polsce w roku 2017 liczba podejrzeń w kierunku odry była wyższa niż w roku 2016, w całym kraju zgłoszono ogółem 262 zachorowania i podejrzenia zachorowań na odrę, stanowi to 76% oczekiwanych zgłoszeń (Ryc. 1).




Fig 1. Measles surveillance performance in Poland 2007-2017.

Ryc. 1. Sprawność nadzoru epidemiologicznego nad odrą w Polsce w latach 2007-2017.

Along with a reliable evidence of the elimination of indigenous measles, efficient detection of the disease imported from other countries is also important in measles elimination strategy. Therefore, the key activities should be investigating all suspected cases of measles, including secondary cases in outbreaks, and performing genotyping of measles virus. In 2017, similarly to previous years, surveillance of measles suspected cases in the country was uneven. Number

W fazie eliminacji odry konieczne jest ściśle monitorowanie podejrzeń zachorowania na odrę oraz przypadków wtórnych w ogniskach, jak również kontynuowanie genetycznych badań szczepów wirusa odry. Działania te umożliwią wiarygodne udokumentowanie eliminacji rodzimych zachorowań na odrę spodziewanej w najbliższych latach, jak również sprawne wykrywanie zachorowań zawlekaných z innych krajów. Tak, jak w latach ubiegłych, w 2016 roku nadzór nad

of serological tests performed in suspected measles cases in 2017 was higher than in the previous year. Of 262 recorded cases and suspected cases of measles, 199 (75.6%) were diagnosed with IgM ELISA test and were performed in the WHO reference laboratory in the Department of Virology NIPH – NIH.

According to the law on control of infections and infectious diseases in humans (Act of 5 December 2008 on prevention and control of infections and infectious diseases in humans, Dz.U.08.234.1570 with further amendments) measles is subjected to statutory notification by a doctor within 24 hours from the time of diagnosis or suspicion of infection. The median number of days between the first visit to the doctor and notification of case or suspected measles cases to the local sanitary-epidemiological stations was 3 days and therefore exceeded the applicable time. To maintain high sensitivity of the serological diagnosis of measles, the specimen should be collected between 7 and 45 day after rash onset date. The highest titer in 2017 is observed on 10 days.

CONCLUSIONS

Despite the increase in the incidence of measles in 2017, compared to 2016, the number of registered suspicions of measles continues to be too low to the expected number. In order to improve the quality of measles surveillance in Poland, it is advisable to promote a program for the elimination of measles among doctors and information on the plan and the degree of program implementation as well as on the current epidemiological situation of the disease in Poland.

The necessity to document and laboratory confirmation of all cases and suspected measles cases, including information about the role of the reference laboratory in the implementation of the program and the possibility of performing free serological tests, should also be underlined.

REFERENCES

1. O'Connor, Jackovic D, Muscat M, et al. Measles and rubella elimination in the WHO Region for Europe: progress and challenges. *Clin Microbiol Infect.* 2017 Aug;23(8):504-510.
2. World Health Organization Global measles and rubella strategic plan: 2012–2020. World Health Organization, Geneva, Switzerland (2012) [Internet] [cited 2019 Jan 29] Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44855/1/9789241503396_eng.pdf

podejrzeniami odry w skali kraju był nierównomierny.

Liczba wykonanych badań serologicznych w przypadkach podejrzenia zachorowania na odrę w roku 2017 była wyższa niż w 2016 roku. Na ogólną liczbę 262 zachorowań i podejrzeń zachorowań badanie serologiczne w klasie IgM wykonano w 199 przypadkach (75,6%). Wszystkie badania wykonano w laboratorium referencyjnym w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH.

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U.08.234.1570 ze zm.) odra podlega ustawowemu obowiązkowi zgłoszenia w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub podejrzenia zakażenia przez lekarza. Mediana liczby dni pomiędzy pierwszą wizytą u lekarza a zgłoszeniem przypadku podejrzenia zachorowania do lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej przekraczała obowiązujący czas i wynosiła 3 dni. W diagnostyce serologicznej odry ważne dla zachowania wysokiej czułości jest to, aby czas od wystąpienia wysypki do pobrania próbki krwi mieścił się w przedziale od 7 do 45 dni. Najwyższe miano obserwowane jest 8 dnia. Mediana liczby dni, które upłynęły od wystąpienia wysypki do pobrania próbki krwi wyniosła w 2017 r. 10 dni.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Pomimo spadku liczby zachorowań na odrę w 2017 r., w porównaniu z rokiem 2016 nadal liczba zarejestrowanych podejrzeń zachorowania na odrę pozostaje optymalna do oczekiwanej liczby.

W celu utrzymania jakości nadzoru nad odrą w Polsce celowe jest propagowanie programu eliminacji odry wśród lekarzy i informacji na temat planu i stopnia realizacji programu oraz na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej choroby w Polsce. Podkreślać należy także konieczność dokumentowania i laboratoryjnego potwierdzania wszystkich przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę z uwzględnieniem informacji o roli laboratorium referencyjnego w realizacji programu i o możliwości wykonywania bezpłatnych badań serologicznych.

3. World Health Organization Regional Office for Europe European Vaccine Action Plan 2015-2020. World Health Organization, Copenhagen (2015) [Internet] [cited 2019 Jan 29] Available from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/255679/WHO_EVAP_UK_v30_WEBx.pdf?ua=1

4. Baumann-Popczyk A, Sadkowska-Todys M, Zieliński A. Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. Bielsko-Biała: a-medica press, 2014.
5. Portal Szczepienia Info, [Internet] [cited 2019 Jan 27] Available from: <http://szczepienia.pzh.gov>.
6. Naruszewicz-Lesiuk D. Measles in Poland in the years 1962-1968 as viewed against the background of the epidemiologic situation throughout the world. *Przeegl Epidemiol.* 1970;24(1):1-14.
7. Wang Z, Yan R, He H, et al. Difficulties in eliminating measles and controlling rubella and mumps: a cross-sectional study of a first measles and rubella vaccination and a second measles, mumps, and rubella vaccination. *PLoS ONE*, 9 (2014).
8. Czarkowski M P, et al. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 r. Warszawa: NIZP-PZH; GIS, 2018,[Internet] [cited 2018 Jan 27] Available from:http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#01,
9. Czarkowski M P, et al. Szczepienia ochronne w Polsce w 2017 r. Warszawa NIZP-PZH; GIS, 2018, [Internet] [cited 2019 Jan 27] Available from: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#05,
10. Definicje przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, Zakład Epidemiologii NIZP-PZH, ww.pzh.gov.pl;

Received: 20.06.2019

Accepted for publication: 10.07.2019

Otrzymano: 20.06.2019 r.

Zaakceptowano do publikacji: 10.07.2019 r.

Address for correspondence:

Adres do korespondencji:

Dr hab. n. o zdr. Iwona Paradowska-Stankiewicz
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy
Zakład Higieny
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
e-mail: istankiewicz@pzh.gov.pl